核准日期：2022年02月25日

本品开封后，在每周用约1次的情况下最多可连续使用8周共计9次，请严格按照要求注射和保存。

注射前：

请使用与本品匹配的[illegible]注射器（型号：DZ[illegible]）。药品的[illegible]使用及保存。请严格按照电子笔式注射器的说明书进行操作。

各系统器官类别	头晕、头痛	皮肤感染
1级皮疹	1级抗组胺、局部皮质类固醇	[illegible]

使用剂量时，胰岛素分泌不足的患者可能会发生典型症状。比如未经诊断的糖尿病可能会在本品治疗期间出现。患者在生长激素治疗期间，应定期监测血糖水平，尤其那些具有糖尿病风险因素的患者（如肥胖、有糖尿病家族史等），并要切换到[illegible]剂量。

目前尚缺乏本品在年轻有用的成人生长激素缺乏症患者中的有效性数据。

「药物相互作用」

•糖皮质激素会抑制本品的促生长作用，同时接受生长激素和糖皮质激素治疗的患儿，应评估调整替代治疗的糖皮质激素剂量，以免出现[illegible]

剂量	0.05 mg/kg/d	0.1 mg/kg/d
例数	7	7
平均值	9407.63	25219.3

ng·h·mL⁻¹。与给予皮下注射重组人生长激素相比，[illegible]

「请遵医嘱者单次皮下注射重组人生长激素注射液回顾明显[illegible]

•儿童生长激素缺乏症（GHD）[illegible]